

AMBULATORIO VACCINALE HPV

Ospedale di Manerbio

Quando si parla di prevenzione delle neoplasie del basso tratto genitale ci si riferisce in particolare alla prevenzione del carcinoma del collo uterino.

Due sono le misure cui fa attualmente riferimento il mondo scientifico e quello dei clinici:

- la diagnosi precoce ed il precoce trattamento delle lesioni a rischio tumorale;
- la vaccinazione contro alcuni ceppi di HPV.

Il PAP-test consiste nel prelievo di cellule dal collo dell'utero con successivo esame microscopico dei campioni. Le donne che presentano un PAP-test patologico o dubbio vengono inviate ad un esame di secondo livello: la colposcopia. Quando la colposcopia evidenzia una lesione sospetta si esegue una biopsia mirata che consente di giungere ad una diagnosi precisa.

Una volta arrivati alla diagnosi istologica di una lesione è indicato il trattamento solo di quelle di una certa gravità; le lesioni più lievi regrediscono spontaneamente in oltre il 70% dei casi entro 1-2 anni.

L'U.O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Manerbio è attivamente impegnata in percorsi di prevenzione-diagnosi e cura di queste patologie attraverso l'ambulatorio per il PAP-test e quello di colposcopia (a quest'ultimo è possibile accedere tramite richiesta del medico specialista o per invio dal Centro Screening dell'ASL di Brescia) seleziona le pazienti da inviare al trattamento. Nel nostro reparto la terapia viene condotta con la tecnica laser in anestesia locale in regime di day hospital con dimissione precoce (circa due ore dopo il trattamento).

E' attivo anche il Servizio per la Prevenzione Primaria attraverso la vaccinazione.

Esistono oggi due tipi di vaccino contro alcuni ceppi di virus che si riconoscono responsabili di circa il 70% dei carcinomi del collo dell'utero. Nel 2008, è partita in tutte le regioni italiane, la campagna di vaccinazione gratuita per le ragazze nel 12° anno di vita.

Poichè l'efficacia del vaccino diminuisce con l'età, l'ASL si fa carico di vaccinare gratuitamente le ragazzine che hanno compiuto 11 anni; il vaccino si è però dimostrato molto efficace anche nelle ragazze fino a 26-28 anni e lo è ancora di più in quelle che non hanno ancora avuto rapporti sessuali. Al fine di garantire, anche alle donne non incluse nella programmazione ASL gratuita, l'opportunità della vaccinazione, Regione Lombardia ha attivato ambulatori ospedalieri presso i quali è possibile accedere alle vaccinazioni con un prezzo agevolato.

Presso l'Ospedale di Manerbio è attivo l'Ambulatorio Vaccinale al quale si accede tramite appuntamento da fissare chiamando la Segreteria dell'U.O. 030.9929405, dalle ore 08.00 alle ore 13.30, nei giorni feriali.

Il colloquio con il medico si effettua presso l'Ambulatorio di Isteroscopia ubicato all'interno dell'Ospedale, scala B 3° piano.

AMBULATORIO VACCINALE HPV

Ospedale di Desenzano del Garda

Il cancro della cervice uterina si sviluppa molto lentamente, in un lasso di tempo che può durare anche dieci-vent'anni. In questo periodo, le cellule che rivestono la cervice uterina subiscono delle modificazioni che le rendono 'atipiche' rispetto a quelle normali.

La diagnosi precoce delle lesioni è possibile sottoponendosi periodicamente al Pap test, l'unico esame in grado di individuare le modificazioni cellulari in stadio iniziale.

Due sono le strategie più efficaci per ridurre il rischio di insorgenza della malattia:

- la **diagnosi precoce** della neoplasia intraepiteliale cervicale;
- la **prevenzione dell'infezione** da HPV con la vaccinazione.

Nel nostro ospedale è a vostra disposizione l'Ambulatorio Vaccinale al quale si accede tramite appuntamento.

Circa il 70% di tutte le lesioni pre-tumorali sono attribuibili a due tipi di papillomavirus (il 16 e il 18), mentre quasi il 90% dei condilomi è causato dai tipi 6 e 11. Attraverso la vaccinazione contro l'HPV è possibile interrompere all'origine la catena che dall'infezione porta al cancro. Se grazie al vaccino l'organismo è in grado di contrastare l'infezione da Papilloma virus, allora non si potranno verificare i cambiamenti delle cellule del collo dell'utero, che portano allo sviluppo del tumore.

I vaccini hanno un'efficacia elevata, se somministrati prima che la persona sia stata contagiata con il virus HPV, che si acquisisce, di norma, subito dopo l'inizio dell'attività sessuale. Inoltre inducono una migliore risposta immunitaria nelle persone più giovani. E sembra che riducano la percentuale di recidiva della malattia nelle pazienti più grandi che hanno trattato una lesione da HPV.

Il ginecologo esegue colloquio informato e consenso alla vaccinazione al 3° piano nell'U.O. di Ginecologia.

Il vaccino viene somministrato presso l'Ambulatorio del Medico Competente ubicato all'ingresso dell'Ospedale nello stesso giorno.

Per l'appuntamento chiamare la Segretaria dell'U.O. allo 030.9145261 dalle ore 14.00 alle ore 15.00, dal Lunedì al Venerdì.

Ospedale di Gavardo

L'ambulatorio è al 3° piano presso il reparto di ginecologia e ostetricia. L'accesso avviene tramite prenotazione al N° 0365.378301-372 nei giorni feriali dalle 8.30 alle 15.30 e pagamento della prestazione alla cassa.