



ASST del GARDA  
C.IPA: asstg  
AOO: asstg-Ospedale  
REG.PROT: RP02  
Prot: 0014491/21  
Del 13/04/2021  
Classifica: 3.1.1

Gent.mi

Medici operanti nei Centri Vaccinali Covid  
dell'ASST del Garda

- Centro Vaccinale Covid di Gavardo
- Centro Vaccinale Covid di Lonato
- Centro Vaccinale Covid di Castelletto di Lenno
- Centro Vaccinale Covid di Manerbio

e p.c.

Gent.mi

- Direttore Generale
- Direttore Amm.vo
- Direttore Socio Sanitario

S E D E

Oggetto: Indicazioni vaccinazioni Covid.

Di seguito si riportano sintetiche indicazioni rispetto alle vaccinazioni Covid previste nei Centri Vaccinali dell'ASST del Garda, sulla scorta delle attuali comunicazioni del Ministero della Salute (0008284 del 3.03.2021, 0014358 del 7.04.2021 e Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19).

#### Tipologia di vaccino.

- I vaccini a mRNA (attualmente Pfizer e Moderna): sono di utilizzo elettivo per i pazienti appartenenti alla categoria di elevata fragilità in cui rientrano persone affette da condizioni che per danno d'organo o in ragione di una compromissione della risposta immunitaria hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi di COVID-19 oppure con disabilità gravi (vedi tabelle allegate), come pure per gli over 80 in ragione dell'aumentato rischio legato all'età; si precisa che l'intervallo tra la 1° e la 2° dose è di almeno 21 giorni per il vaccino Pfizer (utilizzabile per adulti di età pari o superiori ai 16 anni), mentre per il vaccino Moderna è di almeno 28 giorni (utilizzabile per adulti di età pari o superiori ai 18 anni);
- Il vaccino a vettore virale (attualmente AstraZeneca): è raccomandato nelle persone con età superiore ai 60 anni in buone condizioni di salute o se affetti da patologie senza carattere di gravità; in effetti il bilancio rischio/beneficio è progressivamente più favorevole al crescere dell'età, sia per il maggior rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19, sia per il mancato riscontro di un aumentato rischio di eventi trombotici nei soggetti di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino AstraZeneca può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino; non è indicato per le categorie di pazienti con elevata fragilità. L'intervallo tra la prima e la seconda dose è di circa 12 settimane.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775560982 - www.asst-garda.it

PEC: protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447



#### **Vaccinazione nei soggetti allergici**

- I vaccini sono controindicati per i soggetti con ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti (come riportati nella scheda tecnica);
- I soggetti affetti da allergie respiratorie (rinite, congiuntivite, asma), allergie alimentari, allergie da contatto (dermatiti), possono essere vaccinati rimanendo in osservazione per 15 minuti;
- I soggetti con anamnesi positiva per reazioni anafilattiche severe (con interessamento respiratorio e/o circolatorio) da altre sostanze/farmaci o affetti da particolari malattie (mastocitosi, asma non controllata) è opportuno siano vaccinati in ambiente protetto ospedaliero e rimangano in osservazione per 60 minuti.

#### **Vaccinazione nei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2**

- Tempo minimo tra infezione e 1° vaccinazione: n. 3 mesi;
- 1° dose di vaccino effettuata oltre i 6 mesi dalla guarigione: due dosi di vaccino con normale tempistica in base alla tipologia;
- 1° dose di vaccino effettuata entro 6 mesi dalla guarigione: una sola dose di vaccino;
- La dose unica non è prevista per i soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza e per gli over 80.

#### **Vaccinazione nei soggetti che diventano positivi a una infezione da SARS-CoV-2 dopo la prima dose**

Per questi soggetti la 2° dose va programmata almeno dopo tre mesi dalla guarigione.

#### **Rifiuti al vaccino**

Eventuali rifiuti potranno essere gestiti e riprogrammati al termine della campagna vaccinale, secondo la disponibilità di vaccini ed ulteriori eventuali aggiornamenti tecnici sull'utilizzo degli stessi.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Dr. Gaetano Elli**

Allegati: tabella categorie ad elevata fragilità

Responsabili del procedimento: F.to Dr. Lucio Dalfini,  
F.to Dr. Augusto Olivetti  
F.to Dr. Pietro Plovanelli

firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n. 445 del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e norme collegate

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda**

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - [www.asst-garda.it](http://www.asst-garda.it)

PEC: [protocollo@pec.asst-garda.it](mailto:protocollo@pec.asst-garda.it) - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447

## Elenco patologie per considerare un Soggetto estremamente vulnerabile

Malattie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fibrosi polmonare idiopatica</li> <li>Altre malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia</li> </ul>
Malattie cardiocircolatorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA)</li> <li>Pazienti post shock cardiogeno</li> </ul>
Malattie neurologiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLA e altre malattie del motoneurone</li> <li>Sclerosi multipla</li> <li>Distrofia muscolare</li> <li>Paralisi cerebrali infantili</li> <li>Pazienti con patologia neurologica in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive*</li> <li>Miastenia gravis</li> <li>Patologie neurologiche disimmuni</li> </ul>
Diabete/altre endocrinopatie severe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diabete di tipo 1</li> <li>Diabete di tipo 2 con necessità di almeno 2 farmaci o con complicanze</li> <li>Morbo di Addison</li> <li>Panipopituitarismo</li> </ul>
Fibrosi cistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fibrosi cistica</li> </ul>
Insufficienza renale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pazienti in dialisi cronica</li> </ul>
Malattie autoimmuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Malattie autoimmuni/ immunodeficienze primitive con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza*</li> <li>Malattie autoimmuni/ immunodeficienze primitive con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*</li> </ul>
Malattia epatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cirrosi epatica</li> </ul>
Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione autonomia neurologica e cognitiva</li> <li>Paziente che ha subito uno stroke nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking <math>\geq 3</math></li> </ul>
Patologia oncologica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione</li> <li>Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*</li> </ul>
Emoglobinopatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talassemia</li> <li>Anemia a cellule falciformi</li> </ul>
Sindrome di Down	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sindrome di Down</li> </ul>
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido*</li> <li>Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino a 1 anno*</li> <li>Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il 1° anno, nel caso abbiano sviluppato GVHD cronica*</li> </ul>
Grave obesità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pazienti con BMI <math>&gt; 35</math></li> </ul>
HIV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pazienti con diagnosi di AIDS o <math>&lt; 200</math> CD4</li> </ul>
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale, psichica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3*.</li> </ul> <p>Il testo dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, nello specifico, stabilisce quanto segue:  <i>"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità."</i></p>

\* Vaccinare anche conviventi e caregiver che forniscono assistenza. Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.

# ASST Garda - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 0A5B2BBCFB6DB83C339CB8CD7892F01C4EAF1D940583330DAD87E3736089DFE

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0014491/21  
Data Protocollo 13/04/2021  
UOR Competente DIREZIONE SANITARIA

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <https://glifo.asst-garda.it/PortaleGlifo/>

**IDENTIFICATIVO** HLPXB-6698

**PASSWORD** TI3vjsXU4k

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

